



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن
سلامتی روز افزون شما آرزوی ماست

روش های بییهوشی



Ma-Ed-Pa-P-OR.G-۲۴۶

واحد آموزش سلامت

۱۳۹۳

اما در کل عوارض از قبیل، خواب آلودگی، سردرد، گلودرد، احساس سختی در نفس کشیدن، درد عضلات، تهوع، استفراغ، اختلال در حافظه، خارش و گیجی ممکن است رخ دهد که در این حالت عوارض به صورت گذرا و موقت می باشد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شوند. در بیحسی منطقه ای ممکن است بعلت از کار افتادن سیستم عصبی سمپاتیک بیمار دچار کاهش فشارخون و تهوع و استفراغ شده که در این حالت گذرا و دوره ای بوده و با تزریق برخی داروها و تقویت سیستم عصبی سمپاتیک این حالت بیمار کنترل می گردد.



آدرس: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه

ولی عصر، خیابان صبا جنوبی

تلفن: ۶۶۴۶۵۳۵۵

۸-۰۷۵۰۴۶۶

نمابر: ۶۶۴۱۰۱۲۱

www.Madaen hospital.ir

پس از بیهوشی: در بیهوشی عمومی و منطقه ای بعد از اتمام عمل جراحی بیمار مدتی در اتاق ریکاوری که ثر مجموعه اتاق عمل است مانده تا تأثیر داروهای بیهوشی یا بیحسی بتدریج کم شده و وضعیت دستگاههای حیاتی بدن بخصوص دستگاه قلب و عروق و دستگاه تنفس به وضع عادی برگردد. پس از آن بیمار به بخش منتقل می شود. در بیحسی منطقه ای زمانی که بیمار به بخش منتقل گردید توصیه می شود تا مدتی در حالت دراز کش باشد(نشستن زود هنگام موجب بروز سردرد شود) ولی بیمار با اجازه پزشک می تواند در اولین فرصت بشیند و راه برود. بعد از ۲ الی ۳ ساعت حس پاها برگشته ولی قدرت عضلات پاها ممکن است تا ۱۲ ساعت بطور کامل برنگردد و این امر موجب شود بیمار در حالت ایستاده تعادل خوبی نداشته و برای اولین بار با کمک دیگران بایستد و راه برود.

عوارض بیهوشی:

عوارض بیهوشی بسیار مختلف هستند و بسته به داروهای مورد استفاده، تکنیک بکار رفته و وضعیت بیمار متفاوت است.

از این روش فقط جهت جراحی های مناطق پایین بدن از قبیل اعمال جراحی لگن، ران، ساق پا و یا عمل های پایین شکم مثل فتق و سزارین مورد استفاده قرار گیرد. مهمترین نکته رضایت بیمار است که نقش اصلی در انجام این روش دارد.

بیهوشی عمومی: در این روش بیمار کامل بیهوش می شود. داروهایی به بیمار تزریق شده که به مغز رسیده و او را بیهوش می کنند. در این روش بیماران برای تنفس به دستگاه مکانیکی وصل هستند و با این دستگاه تعداد و عمق تنفس تنظیم می شود. ممکن است ترکیبی از روش های ذکر شده استفاده شوند مثلاً استفاده از بیهوشی عمومی همراه با بیحسی منطقه ای برای کاهش درد بیمار بعد از جراحی.

کنترل بیمار در بیهوشی: پیش از بیهوشی علائم حیاتی و پرونده بالینی او بررسی می گردد. در بین علائم حیاتی بیمار از قبیل: فشارخون، عکس قلبی، و میزان اکسیژن خون بیمار کنترل می گردد.

بیحسی منطقه ای: با استفاده از این نوع بیحسی می توان بدن بیمار را از کمر به پای بیحس کرده بطوریکه اصلاً درد را احساس نکرده. در این روش ماده بیحسی را به اطراف نخاع تزریق می کنند. بیحسی منطقه ای بعد از چند دقیقه از تزریق شروع و حدود ۲ الی ۳ ساعت بیمار بیحس می باشد.

در این روش بر روی تخت می نشیند و باید روی یک شانه دراز کشد و همکاری بیمار نقش بزرگی در راحتی و سریعتر انجام شدن این روش دارد. سپس متخصص بیهوشی سوزن بسیار باریکی را از پشت و پایین کمر وی به درون ستون فقرات برده و داروی بیحسی را تزریق می کند. ممکن است در زمان ورود نوک سوزن یک حس شوک یا برق گرفتگی و گزگز در ناحیه کمر احساس می شود. در هنگام تزریق ماده بیحسی یک احساس گرما در پاها بوجود می آید، بعد از بیحسی پاهای بیمار بی حس شده و بعبارت ساده تر پاهای بیمار به او تعلق ندارد.

بیهوشی در لغت به معنای بی دردی است. بیهوشی اقداماتی است که پزشک برای از بین بردن حس درد بیمار بصورت عمومی یا موضعی انجام می دهد. معمولاً این کار توسط متخصص بیهوشی با کمک کاردان یا کارشناس بیهوشی انجام می شود.

روشهای بیهوشی:

بیحسی لوکال، بیحسی منطقه ای، بیهوشی عمومی

بیحسی لوکال: این روش برای جراحی در یک محدوده کوچک (مانند بخیه زدن انگشتان دست یا پا) بکار می رود. در این روش داروی بیحسی در محلی که باید جراحی شود، تزریق می گردد تا اعصاب آن ناحیه از فعالیت بیفتند.

