



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن  
شما آرزوی ماست سلامتی روز افزون

# قرص دیگوکسین



۱۱۲- ۳- Ma-Ed-Pa- M-

واحد آموزش سلامت

۱۳۹۴

❑ برخی از داروها با دیگوکسین اثر  
تداخلی دارند مانند:

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم یا منیزیم.  
دیورتیک هایی مثل اسپرنولاکتون  
لووتیروکسین.

آنتی بیوتیکهایی مانند نئومايسين -  
ریفامپین - اریثرومایسین - تتراسایکلین.

داروهای ضد فشار خون مانند آمیلودیپین  
- دیلتازم - وراپامیل و .....

اگر این داروها و یا غذاهای پر فیبر در  
زمان نزدیک به مصرف دیگوکسین مصرف  
شوند . باعث کم شدن مقدار این دارو در  
خون می شوند . به همین دلیل توصیه می  
شود که این دارو با معده خالی مصرف  
شود.

بنابراین توصیه می شود قبل از مصرف هر  
گونه دارویی حتماً با پزشک خود مشورت  
نمایید.

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به

چهارراه ولی عصر، خیابان صبا جنوبی

تلفن: ۶۶۴۶۵۳۵۵-۸-۶۶۴۰۵۷۰۵

نمابر: ۶۶۴۱۰۱۲۱

[www.Madaen.hospital.ir](http://www.Madaen.hospital.ir)

❑ نباید مقدار دارو بیشتر و یا کمتر از  
مقدار دستور داده شده توسط پزشک  
مصرف شود.

❑ هرگز نباید این دارو را بدون نسخه ی  
پزشک مصرف کرد.

❑ قرص های ۲۵٪ میلی گرم دیگوکسین  
کوچک و سفید بوده ، شبیه برخی قرص  
های مدر می باشند . مراقب باشید آنها را  
با هم اشتباه نکنید . بهتر است هیچ گاه  
قرص های مختلف را داخل یک ظرف  
مخلوط نکنید .

❑ اگر در حال مصرف یک داروی مدر  
دفع کننده پتاسیم از بدن هستید ، مکمل  
پتاسیم خود را حذف کنید . اگر بدنتان  
پتاسیم کافی نداشته باشد ، ممکن است  
مسمومیت با دیگوکسین رخ دهد . اگر  
نمی توانید مکمل پتاسیمی مصرف کنید از  
پزشکان بخواهید نوع دیگری از دارو را  
به شما تجویز کند .

## قرص دیگوکسین

این قرص باعث افزایش قدرت و سرعت انقباض عضله قلب می شود. این دارو با بهبود تعداد ضربان قلب و ضرباهنگ آن بر روی قلب تاثیر می گذارد. در نتیجه گردش خون بهبود یافته و علایم ناشی از وضعیت بد کارکرد قلب مثل تنگی نفس و تورم دست ها و پاها کاهش می یابد. این قرص در اندازه ۰.۲۵ میلی گرمی موجود است.

این دارو در کبد تجزیه می شود و از راه کلیه ها دفع می گردد.

### مکانیسم اثر:

این دارو با بهبود قدرت انقباضی قلب باعث افزایش برون ده قلبی میشود.



## چگونگی مصرف

دیگوکسین معمولاً روزی یک بار تجویز می شود. مهم است که دارو هر روز در ساعت یکسانی مصرف شود. معمولاً بهتر است که صبح ها ناشتا خورده شود تا کمتر فراموش شود. البته اگر عادت دارید برای صبحانه غلات برشته بخورید، مراقب باشید دیگوکسین را حداقل یک ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از صبحانه مصرف کنید. (سبوس موجود در این غلات به دیگوکسین متصل شده از جذب آن جلوگیری می کند).

هر روز پیش از مصرف دیگوکسین، نبضتان را به یک دقیقه بشمارید. اگر این کار را بلد نیستید از یک پزشک یا پرستار بخواهید آن را برای شما بیاموزد.

اگر نبضتان ۶۰ دقیقه یا کمتر بود، پیش از مصرف داروی آن روز، با پزشکتان مشورت کنید.

اگر یک نوبت را فراموش کردید، اگر ظرف ۴ ساعت به یاد آورید مصرفش کنید. در غیراینصورت نوبت فراموش شده را رها کرده به برنامه دارویی معمولتان باز

مقدار دارو را دو برابر نکنید.

اگر به هر دلیل دارو را برای دو یا چند نوبت متوالی مصرف نکرده اید پیش از آغاز مجدد دارو با پزشکان مشورت کنید.

### عوارض جانبی:

- خستگی
- ضعف عضلانی
- خواب آلودگی
- اسهال
- سرگیجه
- بی اشتهایی
- تهوع و استفراغ
- اختلالات بینایی
- اغتشاش شعور

هنگام مصرف دیگوکسین توصیه می شود:

□ دیگوکسین را دور از دسترس کودکان و دور از گرما، نور مستقیم، و حرارت مرطوب نگهداری کنید (در این شرایط دیگوکسین فاسد می شود).

