

آشنایی با آزمایشات آندوسکوپی:

برونکوسکوپی

از برونکوسکوپی جهت مشاهده راههای هوایی داخل ریه‌ها استفاده می‌شود. بسته به نوع آزمایش و نیاز پزشک، لوله‌ای نرم و قابل انعطاف، یا محم و غیرقابل انعطاف، از طریق بینی یا دهان وارد نای و ریه‌ها می‌شود و تصویری از راههای هوایی دستگاه تنفسی در اختیار پزشک می‌گذارد. همچنین می‌توان از این طریق، از راههای هوایی نمونه برداری کرد یا جراحیهای کوچکی انجام داد.


آمادگی جهت برونکوسکوپی:

- 8 ساعت (بسته به نظر پزشک) قبل از انجام آزمایش، از خوردن و آشامیدن اجتناب کنید.
- ممکن است پزشک، برخی از داروهای شما را موقتاً قطع نماید. پس کلیه داروهای مورد استفاده خود را به پزشک خود اطلاع دهید.
- در اثر استفاده از اسپری بی‌حس کننده، ممکن است احساس خفگی و ناراحتی نمایید ولی بدانید که این اسپری، هیچ خطری برای شما ایجاد نخواهد کرد.
- چند ساعت پس از انجام آزمایش، پزشک به شما اجازه خوردن و آشامیدن خواهد داد.
- ممکن است تا چند روز پس از برونکوسکوپی، گلودرد داشته باشید که مساله مهمی نیست.



کولونوسکوپی

قبل از آغاز انجام کولونوسکوپی تزریق مایعات وریدی (سرم) و داروهای آرام بخش انجام می‌شود تا شما در شرایط آرام تری قرار داشته باشید. میزان نبض، فشار خون و تنفس شما توسط دستگاه به طور مرتب چک می‌شود و شما باید به آرامی به سمت چپ خود دراز بکشید. دستگاه کولونوسکوپ از یک لوله ی بسیار باریک و فوق العاده انعطاف پذیر ساخته شده است که در قسمت سر آن دوربینی بسیار کوچک قرار گرفته است که می‌تواند تصاویری بسیار دقیق و واضح همانند میکروسکوپ به ما ارائه دهد. این لوله بیش از 1/8 سانتی متر طول دارد و به راحتی می‌تواند در روده های شما حرکت کند و تصاویر را به طور همزمان بر روی مانیتور دستگاه نشان دهد. لوله از **مقعد** شما به آرامی وارد می‌شود و بدون اینکه دردی حس کنید به آرامی در آن حرکت می‌کند و هنگامی که به سر روده ی بزرگ رسید شما باید به آرامی به پشت دراز بکشید تا پزشک بتواند تصاویر دقیقی از روده ی شما مشاهده کند و اگر مشکلی وجود دارد آن را بررسی نماید.



آمادگی برای انجام کولونوسکوپی:


برای انجام کولونوسکوپی قبل از هر چیزی باید روده های شما به طور کامل خالی و تمیز باشد تا بتوان تصاویر مورد نیاز را به طور دقیق تهیه کرد. به همین منظور باید ۲ روز قبل از انجام کولونوسکوپی مصرف رژیم غذایی سرشار از مایعات را آغاز نمایید تا روده های شما به طور طبیعی و کامل خالی شود. البته می‌توانید از پودرهایی که به این منظور وجود دارند یا از روغن کرچک هم برای تمیز کردن روده های خود استفاده کنید.

اگر روده ی شما به طور کامل تخلیه نشد می‌توانید از شیاف و ملین های قوی هم استفاده کنید تا تمامی محتویات داخل آن به طور کامل تخلیه شود. در نظر داشته باشید بهتر است که روند آماده سازی روده های خود را برای انجام کولونوسکوپی تحت نظر پزشک انجام دهید زیرا اگر ذره ای مدفوع در روده های شما وجود داشته باشد تصاویر کولونوسکوپی وضوح لازم را نخواهند داشت و شما باید مجدداً کولونوسکوپی را تکرار نمایید.

اگر از داروهای رقیق کننده ی خون مانند آسپرین، مکمل های غذایی حاوی آهن، داروهای یا داروی دیابت استفاده می‌کنید حتماً قبل از انجام کولونوسکوپی به پزشک خود اطلاع دهید زیرا می‌تواند برای شما دردسر ساز باشد و منجر به خونریزی گردد.



بیمارستان فوق تخصصی مدائن




سلامتی روز افزون شما آرزوی ماست

راهنمای آشنایی با آزمایشات: آندوسکوپی
گاستروسکوپی، کولونوسکوپی، برونکوسکوپی

واحد آموزش سلامت - ۱۴۰۱

MA-EP-PA-36-01



منبع: کتاب داخلی جراحی برونر

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن

تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولی

عصر، خیابان صبا جنوبی

وب سایت: WWW.Madaen hospital .COM

گاستروسکوپی:

آمادگی جهت گاستروسکوپی

احتمالاً پزشک از شما خواهد خواست که تا ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش، از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید تا معده، خالی و قابل مشاهده باشد. جهت تسهیل انجام آزمایش و راحتی شما، احتمالاً پزشک از یک آرامبخش ملایم استفاده خواهد کرد.

یک ماده بی حس کننده موضعی، به داخل دهان و حلقتان اسپری خواهد شد. این کار ممکن است باعث ایجاد سرفه یا به ظاهر احساس خفگی شود ولی هیچگونه خطری برایتان ایجاد نخواهد کرد.

بطور عادی، وجود لوله اندوسکوپ در داخل لوله گوارش، بدون درد است ولی ممکن است حرکت آن در مری و معده باعث احساس ناراحتی، سرفه یا تهوع شود. گرچه این احساس ناخوشایند است ولی هیچگونه خطری برایتان ایجاد نخواهد کرد. در صورتی که جهت انجام آزمون، از داروهای آرامبخش استفاده شده باشد، لازم است اندکی پس از آزمون، استراحت نمایید و سپس با کمک همراهان به منزل بازگردید.

