

مراقبت های پس از جراحی تعویض مفصل زانو در منزل:

بلافاصله پس از انجام جراحی تعویض مفصل زانو باید مراقبت های خاصی از بیمار را مد نظر قرار داد. مهمترین این مراقبت ها عبارتند از:

۱-مراقبت از زخم جراحی:

زخم جراحی بیمار بخیه شده و روی آن پانسمان قرار گرفته است. پانسمان باید هر چند وقت یکبار تعویض شود. فاصله زمانی بین تعویض پانسمان ها را پزشک مشخص می کند. معمولاً زخم جراحی تا چند روز ترشحات آبی و زلالی دارد که ممکن است پانسمان را خیس کرده و یا روی پانسمان لکه بیندازد.

بعد از چند روز این ترشحات قطع می شود. تا وقتی که پانسمان روی زخم خیس می شود و یا روی آن لکه میفتند نیاز است که تعویض پانسمان در فواصل زمانی انجام شود و معمولاً بعد از توقف ترشحات زخم دیگر نیازی به تعویض مرتب زخم نیست.

با این حال بهتر است تا موقعی که بخیه ها خارج می شوند روی زخم با پانسمان پوشیده باشد تا زخم با لباس تحریک نشود. اگر ترشحات زخم بیش از چند روز طول کشید یا بعد از چند روز ترشحات غلیظ یا زرد رنگ یا بودار شد باید به پزشک معالج اطلاع داد. معمولاً بخیه ها بعد از دو هفته خارج می شوند.

تا وقتی که زخم کاملاً خشک نشده است و بهتر است تا وقتی که بخیه ها خارج نشده اند، اجازه ندهید با آب تماس پیدا کند.



۲-تورم اندام:

در چند ماه اول بعد از عمل مختصری تورم در محل عمل و اندام تحتانی مبتلا وجود دارد که طبیعی است ولی هر گونه افزایش تورم باید به اطلاع پزشک ارتوپد معالج رسانده شود.

تغذیه

قدری بی اشتهايي تا چند هفته بعد از عمل طبیعی است. بهتر است بیمار از مواد غذایی حاوی آهن زیاد و میوه استفاده کند. آب زیاد بنوشد. مواد حاوی مقادیر زیاد ویتامین کا، مثل کلم بروکلی، جگر، لوبیا سبز، سویا، اسفناج، کلم، گل کلم، کاهو، عدس و پیاز را مصرف نکند. الکل ننوشد و از قهوه کمتر استفاده کند

۳- فعالیت بدنی:

تا چند هفته بعد از جراحی، بیمار در شب یا در هنگام فعالیت ممکن است قدری ناراحت باشد که این حالت بتدریج از بین میرود. وی معمولاً باید بتواند بعد از سه تا شش هفته از جراحی فعالیت های سبک روزانه خود در خانه را انجام دهد.

۴- تشکیل لخته:

داروهای برای جلوگیری از لخته شدن خون در اندامهای تحتانی به

بیمار داده میشود که ممکن است تزریقی یا خوراکی باشند. این

داروها تا مدت زمانی که پزشک مشخص کرده است باید مصرف

شوند.

با تمام این اوصاف باز احتمال تشکیل لخته به صفر نمیرسد و وجود دارد. وقوع علائم زیر ممکن است به علت تشکیل لخته در عروق اندام تحتانی باشد و با دیدن آنها باید بلافاصله به پزشک معالج خود مراجعه کنید.

- در در پشت ساق
- قرمزی در پشت ساق
- تورم پا یا ساق یا ران

وجود علائم زیر ممکن است نشانه این باشد که لخته به ریه رسیده است.

در این موارد بیمار باید فوراً به پزشک مراجعه کند.

- تنگی نفس ناگهانی
- درد قفسه سینه بخصوص اگر با تنفس شدیدتر شود.

مراقبت های پس از تعویض مفصل زانو در چند هفته اول

دقت به موارد زیر در چند هفته اول بعد از جراحی مهم

بوده و موجب کاهش بروز عوارض احتمالی میشود.

• وسایلی که بیشتر مورد نیاز است باید در نزدیک محل نشستن بیمار باشد.

• صندلی مورد استفاده باید طوری باشد که محل نشستن آن بالاتر از

معمول و کمی سفت باشد. مبل راحتی مناسب نیست.

• در محلی از منزل که بیمار بیشتر مینشیند لوازم مورد نیازش مثل تلفن، ریموت کنترل ها، رادیو، دستمال کاغذی، لوازم خواندن و نوشتن و داروها را در کنارش بگذارید.

• بیمار بعد از مدتی باید بتواند بر راحتی روی صندلی بنشیند و بلند شود.

• بیمار بتدریج باید فعالیت های روزانه معمول در منزل را شروع کند.

• بیمار طبق یک برنامه منظم باید هر روز مقدار معینی البته با نظر پزشک خود در منزل راه برود. باید هر روز زمان و مسافت راه رفتن بیشتر شود و

بهتر است در صورت امکان بعد از مدتی هر روز مدتی در خارج از منزل

هم راه پیمایی داشته باشد.


• بیمار باید حداقل هر یک ساعت یکبار بلند شده و راه برود.

• لباسی پوشیده شود که جیب های بزرگ داشته باشد تا فرد بهتر بتواند لوازم مورد احتیاجش را در جیب بگذارد.

• چیدمان وسایل داخل خانه را طوری تغییر دهید تا فرد بتواند راحتتر با واکر یا عصای زیر بغل رفت و آمد کند.



بیمارستان فوق تخصصی مدائن



سلامتی روز افزون شما آرزوی ماست

مراقبت در تعویض مفصل زانو

واحد آموزش سلامت-۱۴۰۱

MA-EP-PA-06-01



- اگر زانوی چپ شما عمل شده است و اتومبیل دنده اتوماتیک در اختیار دارید می توانید یک هفته بعد از جراحی رانندگی کنید البته به شرطی که داروهایی که روی هوشیاری تاثیر دارند مصرف نکرده باشید. اگر زانوی راست را عمل کرده اید رانندگی به ۸-۶ هفته بعد از عمل موکول می شود.
- به هر طرفی که مایل هستید می توانید بخوابید.
- در صورت لزوم می توان جهت انجام موارد ذکر شده از کمک یک فیزیوتراپ استفاده کرد.
- بسته به اینکه کار قبلی فرد با چه اندازه از فعالیت بدنی همراه بوده است بین یک و نیم تا دو طول می کشد تا وی بتواند به سر کارش برگردد.
- تا آنجا که می توانید راه بروید ولی راه رفتن جایگزین نرمش هایی که باید انجام بدهید نیست.



منبع: Campell's operative otropeadics.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی مدائن

تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولی

عصر، خیابان صبا جنوبی

تلفن: ۶۶۴۶۵۳۵۵ و ۸-۶۶۴۰۵۷۰۵

وب سایت WWW.Madaen hospital .COM



- در چند هفته بعد از جراحی بیمار باید از واکر یا عصای زیر بغل استفاده کند و تا وقتی حرکت و قدرت عضلات اطراف مفصل ران وی خوب نشده است احتمال زمین خوردن زیاد است و بالا و پایین رفتن از پله ممکن است خطرناک باشد.
- بهتر است تا چند ماه استفاده از پله را به تعویق بیندازد. در بالا رفتن از پله اول باید پای سالم را جلو گذاشته و سپس پای عمل شده را در کنار آن قرار دهد و سپس عصای زیر بغل را جلو بیاورد. در پایین رفتن از پله اول باید عصای زیر بغل را در روی پله پایینی گذاشته و سپس پای عمل شده را روی پله پایینی گذاشته و سپس پای سالم را پایین بیاورد.
- بیمار باید نرمش هایی را که فیزیوتراپ به وی آموزش داده است طبق یک برنامه منظم بصورت روزانه انجام دهد. هدف از انجام این نرمش ها افزایش دامنه حرکت و نرم شدن حرکت مفصل و افزایش قدرت عضلات اطراف مفصل است. این نرمش ها حداقل تا دو ماه بعد از جراحی ادامه میابد. سعی کنید تا آنجا که امکان دارد زانوی خود را خم و راست کنید. اگر وسیله دوچرخه ثابت در اختیار دارید استفاده از آن برای شما مفید است .



قبل از تعویض مفصل

بعد از تعویض مفصل